

分析試験成績書

依頼者 ジャクソン・ラボラトリー・ジャパン株式会社


検体名 ホワイトフレーク



一般財団法人

日本食品分析センター

東京都渋谷区元代々木1-52番1号



2024年10月24日 当センターに提出された上記検体について分析試験した結果は次のとおりです。

分析試験結果

分析試験項目	結果	定量下限	注	方法
乾燥減量	9.4 %	*****	1	常圧加熱乾燥法
ヒ素(Asとして)	検出せず	0.1 mg/kg		原子吸光光度法
鉛	0.10 mg/kg	*****		原子吸光光度法
カドミウム	0.08 mg/kg	*****		原子吸光光度法
総水銀	検出せず	0.01 mg/kg		加熱気化原子吸光光度法
アフラトキシンB ₁	検出せず	5 µg/kg		高速液体クロマトグラフィー
アフラトキシンB ₂	検出せず	5 µg/kg		高速液体クロマトグラフィー
アフラトキシンG ₁	検出せず	5 µg/kg		高速液体クロマトグラフィー
アフラトキシンG ₂	検出せず	5 µg/kg		高速液体クロマトグラフィー
BHC	検出せず	0.01 mg/kg		ガスクロマトグラフィー
総DDT	検出せず	0.01 mg/kg		ガスクロマトグラフィー
アルドリン	検出せず	0.005 mg/kg		ガスクロマトグラフィー
デルトリン	検出せず	0.005 mg/kg		ガスクロマトグラフィー
エンタリン	検出せず	0.005 mg/kg		ガスクロマトグラフィー
ヘパタクロル	検出せず	0.01 mg/kg	2	ガスクロマトグラフィー
ダイアジノン	検出せず	0.01 mg/kg		ガスクロマトグラフィー
パラチオン	検出せず	0.01 mg/kg		ガスクロマトグラフィー
パラチオンメチル	検出せず	0.01 mg/kg		ガスクロマトグラフィー
マラチオン	検出せず	0.01 mg/kg		ガスクロマトグラフィー
PCB	検出せず	0.1 mg/kg		ガスクロマトグラフィー
一般細菌数(生菌数)	300以下/g	*****		標準寒天平板培養法
大腸菌	陰性/2.22g	*****		増菌培養法
カビ数	陰性/0.1g	*****		ポテトデキストロス寒天平板培養法
サルモネラ	陰性/25g	*****		増菌培養法

注1. 測定条件:温度, 105℃;時間, 5時間

注2. ヘパタクロル球嚢を含む。

以上

分析試験成績書

依頼者 ジャクソン・ラボラトリー・ジャパン株式会社


検体名 ベータチップ



一般財団法人

日本食品分析センター

東京都渋谷区元代々木1-52-15



2024年10月23日 当センターに提出された上記検体について分析試験した結果は次のとおりです。

分析試験結果

分析試験項目	結果	定量下限	注	方法
乾燥減量	10.1 %	*****	1	常圧加熱乾燥法
ヒ素(Asとして)	検出せず	0.1 mg/kg		原子吸光度法
鉛	0.06 mg/kg	*****		原子吸光度法
カドミウム	0.04 mg/kg	*****		原子吸光度法
総水銀	検出せず	0.01 mg/kg		加熱気化原子吸光度法
アフラトキシンB ₁	検出せず	5 µg/kg		高速液体クロマトグラフィー
アフラトキシンB ₂	検出せず	5 µg/kg		高速液体クロマトグラフィー
アフラトキシンG ₁	検出せず	5 µg/kg		高速液体クロマトグラフィー
アフラトキシンG ₂	検出せず	5 µg/kg		高速液体クロマトグラフィー
BHC	検出せず	0.01 mg/kg		ガスクロマトグラフィー
総DDT	検出せず	0.01 mg/kg		ガスクロマトグラフィー
アルドリン	検出せず	0.005 mg/kg		ガスクロマトグラフィー
デルトリン	検出せず	0.005 mg/kg		ガスクロマトグラフィー
エンドリン	検出せず	0.005 mg/kg		ガスクロマトグラフィー
ヘプタクロル	検出せず	0.01 mg/kg	2	ガスクロマトグラフィー
ダイアジノン	検出せず	0.01 mg/kg		ガスクロマトグラフィー
パラチオン	検出せず	0.01 mg/kg		ガスクロマトグラフィー
パラチオンメチル	検出せず	0.01 mg/kg		ガスクロマトグラフィー
マラチオン	検出せず	0.01 mg/kg		ガスクロマトグラフィー
PCB	検出せず	0.1 mg/kg		ガスクロマトグラフィー
一般細菌数(生菌数)	4.4×10 ⁴ /g	*****		抗真菌剤添加標準寒天 平板培養法
大腸菌	陰性/2.22g	*****		増菌培養法
カビ数	1.4×10 ⁴ /g	*****		DRBC寒天平板培養法
サルモネラ	陰性/25g	*****		増菌培養法

注1. 測定条件:温度, 105℃;時間, 5時間

注2. ヘプタクロルエポキシドを含む。

以上